Dr. Luis Miguel Cabrera Tobar
PATÓLOGO

Dr. Luis Miguel Cabrera Tobar
Citología | Anatomía Patológica | Inmunohistoquímica
2ª calle 7-79, zona 9 · Oficina 1116 · Edificio Nova Reformador
Tel. 5000 5789 · hiciab@yahoo.es

INFORME HISTOPATOLÓGICO

PLC26- 10.24

PACIENTE	**Yolanda Antonieta Tistoj Méndez**	**EDAD**	**51 años**
MÉDICO	*DR. GERARDO BRAN*	**CLÍNICA/HOSPITAL**	*CCC*
FECHA RECEPCIÓN	*29/10/2026*	**FECHA INFORME**	*04/11/2026*
ESPÉCIMEN	**PIEL**	**PROCEDIMIENTO**	*BIOPSIA*


DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA · Recepción, medidas y muestreo

Fijado en formol, espécimen consistente en un fragmento de tejido de 0.3 centímetros de diámetro. Se incluye la totalidad a estudio histopatológico.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA · Hallazgos histológicos

Los cortes histológicos muestran fragmentos de piel con epidermis que presenta hiperqueratosis ortoqueratósica compacta, hipergranulosis focal en cuña y acantosis irregular, con elongación de las crestas interpapilares de configuración angulada, adoptando un patrón en dientes de sierra. Se identifica degeneración vacuolar de la capa basal, asociada a queratinocitos apoptóticos (cuerpos de Civatte) y un denso infiltrado inflamatorio linfocitario de distribución liquenoide, dispuesto en banda a lo largo de la unión dermoepidérmica, con compromiso focal de la capa basal. En la dermis papilar se observan melanófagos y discreta incontinencia pigmentaria, asociados a cambios inflamatorios crónicos. No se identifican atipia queratinocítica significativa ni características histológicas de malignidad.

DOCUMENTACIÓN MICROSCÓPICA · Microfotografías representativas



DIAGNÓSTICO FINAL · Conclusión anatomopatológica

DIAGNÓSTICO

PIEL, MUSLO (BIOPSIA):

- **DERMATITIS DE INTERFASE LIQUENOIDE, COMPATIBLE CON LIQUEN PLANO CUTÁNEO.**
- **SIN EVIDENCIA DE DISPLASIA EPITELIAL NI MALIGNIDAD.**

COMENTARIO -----

Dr. Luis Miguel Cabrera Tobar · Colegiado No. 11,988

Dr. Luis Miguel Cabrera Tobar
MSc. en Patología
Colegiado No. 11,988

FIN DEL INFORME