DR. LUIS MIGUEL
Cabrera Tobar
PATÓLOGO

Dr. Luis Miguel Cabrera Tobar
Citología | Anatomía Patológica | Inmunohistoquímica
2ª calle 7-79, zona 9 · Oficina 1116 · Edificio Nova Reformador
Tel. 5000 5789 · hiciab@yahoo.es

# INFORME HISTOPATOLÓGICO
BIOPSIA CERVICOUTERINA

PLC26- 9.29

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PACIENTE** | **Katya Maer** | **EDAD** | **38 años** |
| **MÉDICO** | *DR. GERARDO BRAN* | **CLÍNICA/HOSPITAL** | *CCC* |
| **FECHA RECEPCIÓN** | *23/09/2026* | **FECHA INFORME** | *30/09/2026* |
| **ESPÉCIMEN** | **PIEL** | **PROCEDIMIENTO** | *BIOPSIA* |


**DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA** · Recepción, medidas y muestreo


*Fijado en formol, espécimen consistente en un fragmento de piel, de 1.5x0.5 centímetros de diámetro. Se incluye la totalidad a estudio histopatológico.*

**DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA** · Hallazgos histológicos

*Los cortes histológicos muestran piel con proliferación melanocítica benigna localizada en la dermis, constituida por nidos, cordones y células névicas individuales de morfología uniforme. Las células presentan núcleos pequeños, redondos a ovales, sin atipia citológica significativa, observándose maduración progresiva con la profundidad, con disminución del tamaño celular y pérdida de la disposición en nidos. No se identifica componente melanocítico de unión significativo. No se observan actividad mitótica atípica, necrosis ni crecimiento pagetoide. No se identifican características histológicas de malignidad.*

**DOCUMENTACIÓN MICROSCÓPICA** · Microfotografías representativas





**DIAGNÓSTICO FINAL** · Conclusión anatomopatológica

**DIAGNÓSTICO**

**PIEL, OMOPLATO DERECHO (BIOPSIA):**

- **NEVO MELANOCITICO INTRADERMICO.**
- **SIN ATIPIA MELANOCITICA SIGNIFICATIVA, NI EVIDENCIA DE MALIGNIDAD.**
- **BORDES QUIRURGICOS LIBRES DE LESIÓN.**

**COMENTARIO** -----

Dr. Luis Miguel Cabrera Tobar
MSc. en Patología
Colegiado No. 11,988

**Dr. Luis Miguel Cabrera Tobar** · Colegiado No. ~~11,988~~

**FIN DEL INFORME**