LAPCI, S.A.
Dr. Miguel A. Garcés de Marcilla - Dra. Elena Morales Casasola
Clínicas Centro Médico, Torre 1, 9º. Nível.
6ª. Avenida 3-69, zona 10, Guatemala. Tels. 2332-1577 – 2332-9993

INFORME ANATOMOPATOLÓGICO	**No. 2026-2826**
DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL PACIENTE	CARLOS ROBERTO MOLINA MENCOS
MÉDICO TRATANTE	DR. GERARDO BRAN
EDAD	87 AÑOS
SEXO	M
HOSPITAL-CLÍNICA	CENTRO CLÍNICO CUTÁNEO
FECHA DE RECIBIDO	23/09/2026
FECHA DE ENTREGA	28/09/2026
ESPÉCIMEN	BIOPSIA DE LESIÓN EN PIEL DE LA REGIÓN PREESTERNAL IZQUIERDA

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:



FIG.2026-2827
Vista anterior de biopsia de lesión en piel de región preesternal izquierda

Se recibe muestra identificada como biopsia de lesión en piel de la región preesternal izquierda, cuya forma es elíptica de 1.5x1x0.4cm, superficie de piel irregular color café claro con lesión deprimida a nivel central la cual tiene bordes irregulares y discretamente elevados de 0.7cm de diámetro, se tiñen todas las márgenes de resección y se incluyen secciones a estudio de la siguiente manera: bloque 1, bordes apicales; bloques 2 2 y 3, resto del tejido. Dra. Morales/sm

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:

Secciones de bordes apicales muestran piel que se reviste por epidermis sin evidencia de neoplasia. Secciones del área central de la biopsia muestran un carcinoma epidermoide infiltrante con áreas extensas de carcinoma in situ, las que focalmente se continúan con zonas de infiltración a la dermis papilar y se diferencia con grupos de bordes irregulares, con células planas de amplio citoplasma y núcleo grande, pleomórfico, con nucléolo prominente. La infiltración ocupa el espesor total de la dermis papilar

DIAGNÓSTICO:
CARCINOMA EPIDERMOIDE INFILTRANTE, QUE SE ORIGINA EN ÁREAS DE CARCINOMA IN SITU, MODERADAMENTE DIFERENCIADO, OCUPA LA DERMIS PAPILAR, MÁRGENES DE RESECCIÓN LATERALES, APICALES Y PROFUNDAS LIBRES DE LESIÓN.

Dr. Miguel A. Garcés de Marcilla
Médico Patólogo

Dra. Elena Morales Casasola
Médica Patóloga

MG/EM